

Štandard Nežiadúce účinky a alergické reakcie po podaní gadolíniových kontrastných látok

Oddelenie/pracovisko:	Rádiodiagnostické oddelenie
Cieľ :	<ul style="list-style-type: none">- Oboznámiť sa s možnými nežiaducimi reakciami, ich príznakmi a priebehom- Predchádzať nežiadúcim reakciám- V prípade, že nastanú, správne a včasne reagovať

Štandard je záväzný pre:	Všetci zamestnanci RDO		
Platnosť štandardu od:	01.09.2026		
Vypracoval:	MUDr. Peter Lakota	dátum: 20.08.2026	podpis :
Schválil:	Ing. Ľudmila Pohančéniková, MBA	dátum: 27.08.2026	podpis :
Kontrola:	priebežne Vykonávať bude: - primár oddelenia RDO		

Nežiaduce účinky po podaní gadolíniových kontrastných látok

Najčastejšie pozorované nežiaduce reakcie na liek (≥0,5 %) u pacientov, ktorým sa podala gadolíniová KL sú bolesť hlavy, nauzea a závrat.

Najzávažnejšie nežiaduce reakcie u pacientov, ktorým sa podala gadolíniová KL sú zastavenie srdca, syndróm akútnej respiračnej tiesne / pľúcny edém a závažné anafylaktoidné reakcie (vrátane zastavenia dýchania a anafylaktického šoku).

Zriedkavo sa pozorovali oneskorené anafylaktoidné alebo ďalšie idiosynkratické reakcie (po hodinách až niekoľkých dňoch)

Väčšina nežiaducich účinkov bola miernej až stredne závažnej intenzity.

V tabuľke nižšie sú uvedené nežiaduce účinky pozorované po podaní gadolíniová KL Sú klasifikované podľa tried orgánových systémov (MedDRA). Na popis určitej reakcie, jej synonym a súvisiacich stavov je uvedený najvhodnejší pojem podľa klasifikácie MedDRA.

Nežiaduce účinky z klinických skúšaní sú klasifikované podľa ich frekvencií.

Skupiny frekvencií sú definované podľa nasledovnej konvencie:

časté ≥1/100 až <1/10, menej časté ≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000. Nežiaduce účinky identifikované iba po uvedení lieku na trh, a pre ktoré nemožno odhadnúť frekvenciu sú uvedené ako „neznáme“.

Kompletné odporúčenia pre podávanie kontrastných látok v rádiológii vid'

Odporúčania Európskej spoločnosti pre urogenitálnu rádiológiu (ESUR) pre kontrastné látky, verzia 10.0., slovenská verzia

<https://www.slovakradiology.sk/dokumenty/detail/35>

Trieda orgánového systému	Nežiaduce účinky			
	Časté ($\geq 1/100$ až $< 1/10$)	Menej časté ($\geq 1/1000$ až $< 1/100$)	Zriedkavé ($\geq 1/10,000$ až $< 1/1000$)	Neznáme (z dostupných údajov)
Poruchy imunitného systému			Anafylaktická/anafylaktoidná reakcia	
Psychické poruchy			Úzkosť	
Poruchy nervového systému		Bolesť hlavy, parestézia, závraty, poruchy chuti	Psychické poškodenie, abnormálna koordinácia, kŕče	Strata vedomia, kóma, vazovagálne reakcie *
Poruchy oka		Zvýšené slzenie		
Poruchy ucha a labyrintu			Tinnitus	
Poruchy srdca a srdcovej činnosti			Nodálna arytmia	Zastavenie srdca
Poruchy ciev		sčervenanie, hypotenzia		
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína			laryngospazmus, dyspnoe, nádcha, kašeľ, apnoe, sťažené dýchanie	Zastavenie dýchania, pľúcny edém
Poruchy gastrointestinálneho traktu	Nauzea	Sucho v ústach, vracanie	Bolesť brucha, opuch jazyka, svrbenie v ústach, gingivitída, riedka stolica	
Poruchy kože a podkožného tkaniva		Svrbenie, vyrážky, urtikária	Opuch tváre	
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva			Muskuloskeletálne stuhnutie	
Poruchy obličiek a močových ciest				Akútne renálne zlyhanie**
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania		Reakcia v mieste vpichu v dôsledku extravazácie, bolesť v miest podania, malátnosť	Bolesť na hrudníku, pyrexia	
Laboratórne a funkčné vyšetrenia		tachykardia		